



NUMÉRO 16 • JANVIER 2025

L'info du GDS




Toute l'équipe du GDS Picardie et ses élus vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2025 !

Version bovine

Edito du Président

Chères éleveuses, chers éleveurs,



En ce début d'année, je tiens à vous présenter tous mes vœux pour 2025 et je souhaite que l'action collective sanitaire vous apporte de la sérénité.

Pour la première fois, les tarifs de prophylaxie sont les mêmes pour les cinq départements des Hauts de France.


La situation sanitaire est marquée par la présence de plusieurs maladies vectorielles sur le territoire national. La FCO 3 circule dans nos cheptels, la FCO 8 et la MHE se rapprochent chaque semaine de nos élevages. Alors profitez de cette trêve hivernale et de pouvoir manipuler les animaux en toute sécurité pour les protéger. La vaccination est un moyen de prévention efficace : cela vous protège individuellement mais également collectivement car plus il y a d'animaux vaccinés, moins les virus circulent et moins les cheptels seront impactés.



David DEMARCY

Président du GDS Picardie

Bonne année 2025 à tous !



Campagne de prophylaxie bovine 2024 - 2025

La campagne de prophylaxie se déroule du **01/11/2024** au **30/04/2025**.



Tarifs de prophylaxie



Acte	Tarifs
Visite de prophylaxie	36,75 €
Déplacement	1,00 € / km
Prise de sang	3,10 €
Acte de vaccination IBR	1,60 €



Les tarifs ont été **harmonisés** en Hauts-de-France !



Tous les bovins présents sur le DAP (Document d'Accompagnement des Prélèvements) le jour de la prophylaxie doivent être prélevés.

Règles de campagne de prophylaxie 2024 - 2025

Voici un récapitulatif des analyses obligatoires (IBR, Brucellose, Leucose, Varron, Tuberculose) ainsi que celles qui vous sont conseillées (Paratuberculose, Douve).



Analyses obligatoires

Maladie	Éleveurs concernés	Animaux concernés
IBR	Dépistage allégé : Indemnes depuis plus de 3 ans (sauf élevages à risque sanitaire)	<ul style="list-style-type: none"> Si effectif < ou = 40 bovins âgés de 24 mois et plus : tous les bovins Si effectif > 40 bovins âgés de 24 mois et plus : 40 bovins
	Dépistage non allégé : Indemnes depuis moins de 3 ans	Tous les bovins âgés de 24 mois et plus en analyses de mélange
	Non indemne	Tous les bovins âgés de 12 mois et plus y compris 25 mâles en analyses individuelles
Brucellose	Allaitants	20% des animaux âgés de 24 mois et plus
Leucose	Allaitants pour 20% des communes	20% des animaux âgés de 24 mois et plus
Varron	Tirage aléatoire des élevages allaitants + élevages sous surveillance	20% des animaux âgés de 24 mois et plus
Tuberculose	Elevages en lien épidémiologique avec un foyer (gestion par la DDPP)	Animaux âgés de 12 mois et plus



Eradication IBR : nouvel arrêté !

Les Arrêtés Ministériels techniques et financiers parus en juin 2024 fixent de nouvelles mesures :

- Renforcement des restrictions aux mouvements pour les bovins non indemnes et infectés.
- Accélération de l'assainissement avec obligation de réformer les animaux infectés pour tous les troupeaux en processus d'assainissement.
- Qualification des troupeaux d'engraissement.



Éleveurs en assainissement :

- **Avec bovins infectés :**

La prophylaxie a dû être réalisée avant le **31/12/2024**

- **Sans bovins infectés :**

La prophylaxie est à réaliser avant le **31/01/2025**



Analyses réalisées sur le lait chez les éleveurs laitiers

⇒ **IBR** : deux fois par an pour les cheptels indemnes depuis plus de 3 ans et six fois par an pour les indemnes depuis moins de 3 ans.

⇒ **Brucellose** : une fois par an

⇒ **Leucose** : une fois par an, pour 20% des communes du département.

Attention, si vous arrêtez la production laitière, contactez le GDS pour connaître les interventions à réaliser sur votre troupeau.



Analyses conseillées

Maladie	Animaux concernés	Éleveurs concernés
Paratuberculose	> 24 mois,	Éleveurs en plan de lutte
	possible dès 18 mois	Éleveurs en garantie de cheptel Dépistage volontaire
Douve	> 24 mois	Allaitants

Impact de la FCO (BTV-3) sur les élevages ovins et bovins de Picardie : analyse par espèce et par département, entre la suspicion clinique et 1 mois après

Situation en France



En 2023, le sérotype 3 de la FCO (BTV-3) a émergé en Europe du Nord et a affecté un très grand nombre de troupeaux de ruminants. Les premiers foyers français ont été confirmés début août 2024 dans l'Aisne, les Ardennes et le Nord. En cette fin 2024, la France recense 8710 foyers, dont 892 en Picardie.

Situation en Picardie

La FCO a impacté l'Aisne beaucoup plus tôt que la Somme et l'Oise en raison de sa proximité avec la Belgique, d'où le virus s'est propagé. Cette situation a donc laissé moins de temps pour mettre en place la vaccination des élevages par rapport aux autres départements.

Quelques chiffres régionaux

Nombre d'élevages déclarés foyers au 12/12/2024 en Picardie		
	Bovins	Ovins
Aisne	419	166
Oise	64	36
Somme	181	26
Total	664	228



Rappels de l'étude menée par le GDS Picardie

Le GDS Picardie a lancé une **enquête** fin septembre 2024 auprès des élevages picards infectés en FCO, pour **comprendre la progression de la maladie** et son **impact clinique** au cours du temps. L'étude suit l'évolution des élevages infectés à 4 moments clés :



Résultats des enquêtes réalisées dans 100 élevages bovins et 63 élevages ovins entre la suspicion clinique et 1 mois après celle-ci

★ Morbidité (% d'animaux malades par exploitation)

	AISNE	OISE	SOMME
Moyenne Bovins +24 mois	12%	9%	4%
Moyenne Bovins 6-24 mois	8%	5%	1%
Moyenne Bovins 0-21 jours	16%	2%	26%

	AISNE	OISE	SOMME
Moyenne Brebis +12 mois	23%	7%	3%
Moyenne Agnelles 6-12 mois	19%	2%	0%
Moyenne Jeunes 22j-6 mois	25%	0%	0%
Moyenne Béliers	30%	23%	7%






Concernant la morbidité chez les bovins, les **adultes** et les **veaux** sont particulièrement impactés. Les éleveurs observent notamment une recrudescence de veaux naissant en **mauvaise forme**, avec un **manque d'énergie** notable.

Concernant la morbidité chez les ovins, les **brebis de plus de 12 mois** sont particulièrement touchées. L'étude a également révélé un impact significatif sur les **béliers**, avec une **baisse de forme** marquée et des périodes temporaires d'**infertilité** liées à la FCO.

De manière générale, les données montrent que les ovins sont les plus impactés par le sérotype 3 de la FCO, avec des taux de morbidité nettement plus élevés, notamment dans le département de l'Aisne.


Résultats des enquêtes réalisées dans 100 élevages bovins et 63 élevages ovins entre la suspicion clinique et 1 mois après celle-ci

* Principaux signes cliniques



Les graphiques mettent en évidence les principaux symptômes observés au sein des exploitations. Les plus fréquents à T0 sont l'**abattement**, la **fièvre** et la **chute de l'appétit**, touchant plus d'1 élevage sur 2 pour certains signes. À T0+1 mois, ces mêmes symptômes restent présents mais en proportion réduite, indiquant une amélioration partielle de l'état des animaux. Cependant, des signes cliniques comme les **raideurs** et **boiteries**, le **jetage nasal**, et la **diminution de la production laitière** persistent, montrant un impact durable de la maladie sur les élevages. La diminution de la production laitière peut aller jusqu'à -50%. Elle se caractérise aussi par des coupées de lait soudaines ou des débuts après vêlages compliqués.

* Mortalité (% d'animaux morts par exploitation)



	AISNE	OISE	SOMME
Moyenne Bovins +24 mois	1%	1%	1%
Moyenne Bovins 6-24 mois	2%	0,05%	0,4%
Moyenne Bovins 0-21 jours	33%	5%	18%

Le taux de mortalité chez les bovins reste faible. **25% des élevages observent de la mortalité au sein de leur élevage.** La classe d'âge des veaux reste la plus touchée par la mortalité. En parallèle, les éleveurs constatent une hausse du nombre de vêlages précoces, des avortements ainsi qu'une hausse des retours en chaleurs.

D'après ATEMAX, **+218% de hausse de mortalité sur 3 mois dans l'Aisne ! +65% dans l'Oise et +14% dans la Somme.** Plus mesuré en bovin de 2 à 8%.



	AISNE	OISE	SOMME
Moyenne Brebis +12 mois	10%	4%	3%
Moyenne Agnelles 6-12 mois	6%	0%	0%
Moyenne Jeunes 22j-6 mois	19%	0%	0%
Moyenne Béliers	17%	2%	0%

Chez les éleveurs ovins, 65 % d'entre eux observent une augmentation de la mortalité, **un chiffre nettement plus élevé que chez les bovins.** Toutefois, les résultats montrent de fortes variations entre les exploitations et les départements.

* Vaccination

Exploitations enquêtées ayant vacciné entre le 02/08/2024 et le 20/11/2024

	PICARDIE
Cheptels ovins	75%
Cheptels bovins	37%

»» La FCO au coeur des Réunions Sanitaires Hivernales 2024 !

Les réunions sanitaires hivernales organisées par le GDS Picardie ont, cette année encore, rencontré un vif succès avec, au total, **368 participants.**

La thématique centrale de cette édition : **la Fièvre Catarrhale Ovine.** À travers des échanges riches et constructifs, les participants ont pu bénéficier de témoignages précieux de vétérinaires et de retours d'expériences du terrain.

Le GDS Picardie remercie chaleureusement tous les participants ainsi que les intervenants pour leur présence, leur convivialité et leur implication dans ces moments d'échange essentiels !



Groupement de Défense Sanitaire de Picardie

Site de l'Aisne

Zone d'Activités du griffon
CS 10 685
02007 Barenton-Bugny Cedex

Site de l'Oise

Rue Frère Gagne BP 40463
60021 Beauvais Cedex

Site de la Somme

19 bis rue Alexandre Dumas
80096 Amiens Cedex 3